

احصل على لقاح الكوفيد-19



لقاحات الكوفيد-19 فعالة في حمايتك من الكوفيد-19، وخاصة الأمراض الشديدة والوفاة. تقلل لقاحات الكوفيد-19 من خطر قيام الأشخاص بنشر الفيروس المسبب الكوفيد-19.



انه مجاني!



سيساعد على
حمايتك
أنت و عائلتك



إنه لقاح آمن!

إعرف المزيد

تذكر

- يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكن لا بد من أن تحتفي في غضون أيام قليلة.
- لقاح فايزر- بيوا إن تك (Pfizer-BioNTech) للكوفيد-19 و لقاح موديرنا (Moderna) للكوفيد-19 يحتاج إلى حقنتين للحصول على أقصى قدر من الحماية. يجب أن تحصل على الحقنة الثانية حتى إذا كان لديك آثار جانبية بعد الحقنة الأولى، إلا إذا كان مقدم التلقيح أو طبيبك قد أخبرك بأن لا تحصل عليها.
- يعتبر الناس مُلقحين بشكل كامل بعد أسبوعين من أخذ الحقنة الثانية من لقاح فايزر- بايو إن تك (Pfizer-BioNTech) أو موديرنا (Moderna) للكوفيد-19، أو أسبوعين بعد أخذ الجرعة الواحدة من لقاح الكوفيد-19 جي و جي/ جونسون (J & J/Janssen).

ماذا يمكن أن تتوقع

على الذراع حيث حصلت على الحقنة:

- الألم
- احمرار في الجلد
- تورم

في باقي جسدك:

- التعب
- الصداع
- ألم عضلي
- القشعريرة
- الحمى
- الغثيان



إذا تم تلقيحك بالكامل، يمكنك المشاركة في العديد من الأنشطة التي قمت بها قبل انتشار الوباء.
تعرف على المزيد حول ما يمكنك القيام به عندما يتم تلقيحك بالكامل. 